

GT115 二代甘油菌种说明书

● 产品规格 (CAT#: Bec-1090)

| | | |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| Mach1-T1 二代甘油菌 | 400 μ l / 1 支 | 保存: -80 $^{\circ}$ C/大于 10 年 |
| LB 平板 | 9cm / 2 块 | 4 度保存/30 天 |
| 一次性接种环 | 4 支 | —— |

● 基因型

F- mcrA Δ (mir-hsdRMS-mcrBC) f80lacZDM15 Δ lacX74 recA1 rpsL (Str^R) endA1 Δ dcm uidA(DM1ul)::pir-116 Δ sbcC-sbcD

● 产品说明

GT115 菌株, 是专门用来克隆含有发夹结构 (Hairpin) 或重复序列等 DNA 二级结构的基因序列的大肠杆菌菌株。大肠杆菌中存在一种 SbcCD 蛋白复合体, 可以识别 DNA 发夹结构, 并将其切除; 将 sbcC 和 sbcD 两个基因突变, 增强了发夹结构 DNA 的稳定性。同时在大肠杆菌基因组中引入 uidA(DM1ul)::pir-116, 使 GT115 可以表达 π 蛋白, 含有 R6Kg ori 复制子的质粒 (pCpG-mcs、pCpG-LacZ、pCpG-siRNA ...) 可以正常复制。该菌株还含有具有核酸酶 (endA) 突变、重组酶 (recA) 突变, 增强了外源 DNA 的稳定性。本产品为二代甘油菌株 (一代种扩增两个世代后保种), 未经过大量扩繁, 核 DNA 及表型稳定, 菌落表型及生长曲线与原种匹配度大于 99.5%。

● 操作方法

1, 客户收到菌株后, 不可直接吸取菌液接种扩繁。应先对菌种进行复壮, 待长出单菌落后挑单菌落接菌扩繁; 复壮方法如下: 在超净台打开盖子, 用接种环沾取少量甘油菌液采用交叉划线法 (图 1) 在 LB 平板表面轻轻划线 (注意: 不要刺破培养基), 将平板封口后放 37 度培养 15-20h, 即可长出单菌落。

2, 交叉划线法: 划线的目的是经过几次不连续划线达到梯度稀释菌液的效果, 保证能长出单菌落。具体步骤如下:

A, -80 度取出的甘油菌应在超净台打开盖子, 立即在表面挑取菌液/菌块划线, 不用等融化后划线, 固体状态时即可用接种环挑取划线, 操作要点是“快速操作, 立即划线”, 目的是最大限度减少温度波动对菌种造成的“冷休克”和冰晶物理损伤; 如果收到的是液体甘油菌, 可直接划线, 在超净台打开盖子用接种环沾取少量甘油菌液划线。

B, 取出无菌接种环, 注意不要污染, 图 1 所示为标准的五段交叉划线法, 分五个区, 每个区划三条直线, 第 1、2 区可共用一个接种环, 划好 1, 2 区后换一个新接种环划第 3 区, 再换一个新接种环划第 4 区, 再换一个新接种环划第 5 区, 每一次换接种环划线要经过前面划线区的划线痕迹, 这样就相当于对菌种进行稀释。简易划线也可只划 3 个区或 4 个区。

C, 客户也可用金属接种环灼烧后划线; 本公司提供的接种环为 ABS 材质, 不可灼烧。




图 1. 五段交叉划线法示意图

● 注意事项

- 1, 客户收到二代甘油菌株后, 应立即放-80度保存, 不可放-20度保存。
- 2, 应减少甘油菌冻融的次数, 冻融的次数越多, 菌种的活力越低;
- 3, 若扩繁菌种, 注意一次扩繁不要超过四个世代, 以保证菌种基因组的稳定; 扩增后重新保存的菌种必须对菌种做表型、功能验证, 所有表型、功能保持完好的菌株才能作为菌种使用。